

<https://asia-genomics.vn/>

Thông tin bệnh nhân

BARACLUDE® (BEAR ah klude)
(entecavir)
Máy tính bảng

BARACLUDE® (BEAR ah klude)
(entecavir)
Dung dịch uống

Đọc Thông tin Bệnh nhân này trước khi bạn bắt đầu dùng BARACLUDE và mỗi lần bạn được bổ sung thêm. Có thể có những thông tin mới. Thông tin này không thay thế việc trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về tình trạng bệnh lý hoặc cách điều trị của bạn.

Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về BARACLUDE là gì?

1. Tình trạng nhiễm vi-rút viêm gan B (HBV) của bạn có thể trở nên trầm trọng hơn nếu bạn ngừng dùng BARACLUDE. Điều này thường xảy ra trong vòng 6 tháng sau khi ngừng BARACLUDE.
 - Dùng BARACLUDE đúng theo quy định.
 - Đừng dùng hết BARACLUDE.
 - Đừng ngừng BARACLUDE mà không nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.
 - Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nên theo dõi sức khỏe của bạn và làm xét nghiệm máu thường xuyên để kiểm tra gan của bạn nếu bạn ngừng dùng BARACLUDE.
2. Nếu bạn nhiễm hoặc nhiễm HIV mà không được điều trị bằng thuốc trong khi dùng BARACLUDE, vi-rút HIV có thể phát triển khả năng kháng một số loại HIV nhất định thuốc và việc điều trị trở nên khó khăn hơn. Bạn nên xét nghiệm HIV trước khi bắt đầu dùng BARACLUDE và bất cứ lúc nào sau đó khi bạn có nguy cơ bị phơi nhiễm HIV.

BARACLUDE có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm:

3. Nhiễm axit lactic (tích tụ axit trong máu). Một số người đã dùng BARACLUDE hoặc các loại thuốc như BARACLUDE (một chất tương tự nucleoside) đã phát triển một tình trạng nghiêm trọng gọi là nhiễm axit lactic. Nhiễm axit lactic là một trường hợp cấp cứu y tế nghiêm trọng có thể gây tử vong. Nhiễm axit lactic phải được điều trị tại bệnh viện. Các báo cáo về tình trạng nhiễm axit lactic do BARACLUDE thường liên quan đến những bệnh nhân bị bệnh nặng do bệnh gan hoặc tình trạng bệnh lý khác.

<https://asia-genomics.vn/>

Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận được bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào sau đây của nhiễm axit lactic:

- Bạn cảm thấy rất yếu hoặc mệt mỏi.
- Bạn bị đau cơ bất thường (không bình thường).
- Bạn khó thở.
- Bạn bị đau bụng kèm theo buồn nôn và ói mửa.
- Bạn cảm thấy lạnh, đặc biệt là ở tay và chân.
- Bạn cảm thấy chóng mặt hoặc choáng váng.
- Bạn có nhịp tim nhanh hoặc không đều.

4. Vấn đề nghiêm trọng về gan. Một số người dùng các loại thuốc như BARACLUDE đã phát triển các vấn đề nghiêm trọng về gan gọi là nhiễm độc gan, với gan to (gan to) và mỡ trong gan (nhiễm mỡ). Gan to kèm theo nhiễm mỡ là một cấp cứu y tế nghiêm trọng có thể gây tử vong.

Hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận được bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào sau đây của các vấn đề về gan:

- Da hoặc phần lòng trắng của mắt bạn chuyển sang màu vàng (vàng da).
- Nước tiểu của bạn chuyển sang màu sẫm.
- Phân của bạn chuyển sang màu nhạt.
- Bạn không muốn ăn trong vài ngày hoặc lâu hơn.
- Bạn cảm thấy khó chịu ở bụng (buồn nôn).
- Bạn bị đau bụng dưới.

Bạn có nhiều khả năng bị nhiễm axit lactic hoặc các vấn đề nghiêm trọng về gan nếu bạn là phụ nữ, rất thừa cân hoặc đang dùng thuốc tương tự nucleoside, như BARACLUDE, trong một thời gian dài.

BARACLUDE là gì?

BARACLUDE là thuốc kê đơn dùng để điều trị vi rút viêm gan B mãn tính (HBV) ở người lớn và trẻ em từ 2 tuổi trở lên mắc bệnh gan đang hoạt động.

<https://asia-genomics.vn/>

- BARACLUDE sẽ không chữa khỏi HBV.
- BARACLUDE có thể làm giảm lượng HBV trong cơ thể.
- BARACLUDE có thể làm giảm khả năng nhân lên và lây nhiễm của HBV vào các tế bào gan mới.
- BARACLUDE có thể cải thiện tình trạng gan của bạn.
- Người ta không biết liệu BARACLUDE có làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư gan hoặc tổn thương gan (xơ gan) hay không, có thể do nhiễm HBV mạn tính gây ra.
- Người ta không biết liệu BARACLUDE có an toàn và hiệu quả khi sử dụng cho trẻ em dưới 1 tuổi hay không.
2 tuổi.

Tôi nên nói gì với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình trước khi dùng BARACLUDE?

Trước khi dùng BARACLUDE, hãy báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn:

- có vấn đề về thận. Liều lượng hoặc lịch trình BARACLUDE của bạn có thể cần phải được đã thay đổi.
- đã từng dùng thuốc điều trị HBV trước đây. Một số người, đặc biệt là những người đã được điều trị nhiễm HBV bằng một số loại thuốc khác, có thể phát triển đề kháng với BARACLUDE. Những người này có thể nhận được ít lợi ích hơn từ việc điều trị bằng BARACLUDE và có thể bị bệnh viêm gan nặng hơn sau khi vi rút kháng thuốc xuất hiện. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ thường xuyên kiểm tra mức độ virus viêm gan B trong máu của bạn.
- có bất kỳ tình trạng bệnh lý nào khác.
- đang mang thai hoặc dự định có thai. Người ta không biết liệu BARACLUDE có gây hại cho thai nhi của bạn hay không. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu bạn đang mang thai hoặc dự định có thai.

Cơ quan đăng ký mang thai bằng thuốc kháng vi-rút. Nếu bạn dùng BARACLUDE khi đang mang thai, hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về cách bạn có thể tham gia Cơ quan đăng ký thuốc kháng vi-rút khi mang thai của BARACLUDE. Mục đích của việc đăng ký mang thai là thu thập thông tin về sức khỏe của bạn và em bé.

<https://asia-genomics.vn/>

- đang cho con bú sữa mẹ hoặc dự định cho con bú sữa mẹ. Người ta không biết liệu BARACLUDGE có thể truyền vào sữa mẹ hay không. Bạn và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nên quyết định xem bạn sẽ dùng BARACLUDGE hay cho con bú sữa mẹ.

Báo cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về tất cả các loại thuốc bạn dùng, bao gồm thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn, vitamin và thảo dược bổ sung.

Đặc biệt hãy nói với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn nếu trước đây bạn đã dùng thuốc để điều trị HBV.

Biết các loại thuốc đã dùng. Giữ danh sách các loại thuốc bên mình để cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dược sĩ của bạn biết khi bạn nhận được một loại thuốc mới.

Tôi nên dùng BARACLUDGE như thế nào?

- Dùng BARACLUDGE chính xác như nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn yêu cầu.
- Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ cho bạn biết lượng BARACLUDGE cần dùng.
- Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ cho bạn biết thời điểm và tần suất dùng BARACLUDGE.
- Uống BARACLUDGE khi bụng đói, ít nhất 2 giờ sau bữa ăn và ít nhất 2 giờ trước bữa ăn tiếp theo.

- Nếu bạn đang dùng Dung dịch uống BARACLUDGE hoặc cho con bạn uống, hãy cẩn thận đo liều bằng thìa định lượng được cung cấp như sau:

- Giữ thìa định lượng ở tư thế thẳng đứng (thẳng đứng) và từ từ châm thìa vào vạch đo trên thìa định lượng đúng với liều lượng quy định. Đưa thìa định lượng ngang tầm mắt để đảm bảo mức dung dịch uống BARACLUDGE



Hình 1

đang ở đúng vạch đo (xem Hình 1).

- Để thìa định lượng ngang tầm mắt, cầm thìa với vạch đo hướng về phía bạn, kiểm tra xem thìa đã được đổ đầy đúng vạch đo chưa.


Mặt trên của Dung dịch uống BARACLUDGE trong thìa định lượng sẽ trông cong chứ không phẳng. Đo liều dung dịch uống BARACLUDGE tại thời điểm

đáy đường cong. Liều lượng của bạn

BARACLUDGE uống Giải pháp là

được đo chính xác khi đáy của đường cong thẳng hàng với vạch đo liều lượng quy định.

Ví dụ, Hình 2 cho thấy cách đúng để đo liều BARACLUDGE 5 mL (xem Hình 2).



Hình 2

- Dung dịch uống BARACLUDGE nên được nuốt trực tiếp sau khi dùng thuốc thìa.

<https://asia-genomics.vn/>

- Không được trộn dung dịch uống BARACLUDE với nước hoặc bất kỳ chất nào khác.
chất lỏng khác.
- Sau mỗi lần sử dụng, rửa sạch thìa định lượng bằng nước và để khô tự nhiên.
- Nếu bạn làm mất thìa định lượng, hãy gọi cho dược sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn để được hướng dẫn.
- Đừng thay đổi liều lượng hoặc ngừng dùng BARACLUDE mà không nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.
- Nếu bạn bỏ lỡ một liều BARACLUDE, hãy uống ngay khi bạn nhớ ra và sau đó dùng liều tiếp theo vào thời gian thông thường. Nếu gần đến thời gian dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên. Không dùng hai liều cùng một lúc. Hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của bạn nếu bạn không chắc chắn phải làm gì.
- Khi nguồn cung cấp BARACLUDE của bạn bắt đầu cạn kiệt, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc nhà thuốc của bạn để được bổ sung thêm. Đừng dùng hết BARACLUDE.
- Nếu bạn dùng quá nhiều BARACLUDE, hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn hoặc đến phòng cấp cứu gần nhất ngay lập tức.

Những tác dụng phụ có thể xảy ra của BARACLUDE là gì?

BARACLUDE có thể gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Xem “Thông tin quan trọng nhất tôi nên biết về BARACLUDE là gì?”

Các tác dụng phụ thường gặp nhất của BARACLUDE bao gồm:

- đau đầu
- mệt mỏi
- chóng mặt
- buồn nôn

Hãy cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn biết nếu bạn có bất kỳ tác dụng phụ nào làm bạn khó chịu hoặc tác dụng phụ đó không biến mất.

Đây không phải là tất cả các tác dụng phụ có thể xảy ra của BARACLUDE. Để biết thêm thông tin, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ.

<https://asia-genomics.vn/>

Gọi cho bác sĩ để được tư vấn y tế về tác dụng phụ. Bạn có thể báo cáo tác dụng phụ cho FDA theo số 1-800-FDA-1088.

Tôi nên bảo quản BARACLUDE như thế nào?

- Bảo quản Viên nén hoặc Dung dịch uống BARACLUDE ở nhiệt độ phòng, trong khoảng 68°F và 77°F (20°C và 25°C).
- Bảo quản viên nén BARACLUDE trong hộp đậy kín.
- Bảo quản Viên nén BARACLUDE hoặc Dung dịch uống BARACLUDE trong hộp đựng ban đầu và để hộp tránh ánh sáng.
- Vứt bỏ BARACLUDE đã lỗi thời hoặc không còn cần thiết một cách an toàn. Vứt bỏ các loại thuốc không sử dụng thông qua các chương trình thu hồi của cộng đồng khi có sẵn hoặc đặt BARACLUDE vào một thùng chứa kín khó nhận dạng trong thùng rác gia đình.

Giữ BARACLUDE và tất cả các loại thuốc ngoài tầm với của trẻ em.

Thông tin chung về việc sử dụng BARACLUDE an toàn và hiệu quả

BARACLUDE không ngăn cản bạn truyền vi-rút viêm gan B (HBV) sang người khác qua quan hệ tình dục, dùng chung kim tiêm hoặc tiếp xúc với máu của bạn. Nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn về các thực hành tình dục an toàn để bảo vệ bạn tình của bạn. Không bao giờ dùng chung kim tiêm. Không dùng chung các vật dụng cá nhân có thể dính máu hoặc dịch cơ thể, như bàn chải đánh răng hoặc lưỡi dao cạo. Hiện có một mũi tiêm (vắc-xin) để bảo vệ những người có nguy cơ bị nhiễm HBV.

Thuốc đôi khi được kê đơn cho những mục đích khác với những mục đích được liệt kê trong tờ Thông tin Bệnh nhân.

Không sử dụng BARACLUDE cho tình trạng bệnh lý không phù hợp

quy định. Đừng đưa BARACLUDE cho người khác, ngay cả khi họ có cùng triệu chứng với bạn. Nó có thể gây hại cho họ.

Tờ thông tin bệnh nhân này tóm tắt những thông tin quan trọng nhất về BARACLUDE. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, hãy nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn.

Bạn có thể hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoặc dược sĩ của mình để biết thông tin về BARACLUDE được viết cho các chuyên gia y tế.

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.Baraclude.com hoặc gọi 1-800-321-1335.

<https://asia-genomics.vn/>

Các thành phần trong BARACLUDE là gì?

Thành phần hoạt chất: entecavir

Thành phần không hoạt động trong viên nén BARACLUDE: lactose monohydrat, cellulose vi tinh thể, crospovidone, povidone, magie stearat.

Vỏ màng của máy tính bảng: titan dioxide, hypromellose, polyethylen glycol 400, polysorbate 80 (chỉ viên 0,5 mg) và oxit sắt đỏ (chỉ viên 1 mg).

Thành phần không hoạt động trong dung dịch uống BARACLUDE: maltitol, natri citrate, axit xitric, methylparaben, propylparaben và hương cam.

Phân phối bởi:

Công ty Bristol-Myers Squibb

Princeton, NJ 08543 Hoa Kỳ

Thông tin bệnh nhân này đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt.

[Mã in]

Sửa đổi: tháng 8 năm 2015